

Wichtige Anwendungshinweise



SCHNELL!

Für eine maximale Wirksamkeit sollte die Pille Danach so schnell wie möglich nach der Verhütungspanne eingenommen werden.



BIS 5 TAGE DANACH!

Die Einnahme der Pille Danach mit dem Wirkstoff Ulipristalacetat kann bis 5 Tage nach der Verhütungspanne zu jeder Zeit innerhalb des Zyklus erfolgen, am besten jedoch so schnell wie möglich.



VERSPÄTETE BLUTUNG?

Die Monatsblutung kann sich aufgrund der Wirkweise der Pille Danach um ein paar Tage verschieben. Ein Schwangerschaftstest kann für Beruhigung sorgen.



ERBRECHEN?

Ein Erbrechen innerhalb von 3 Stunden nach der Einnahme der Pille Danach macht eine zusätzliche Einnahme nötig.



SEX NACH ellaOne®?

Sicherheitshalber sollte ein verlässliches Barriere-Kontrazeptivum (z. B. Kondom) bis zur nächsten Monatsblutung genutzt werden, auch wenn mit Antibabypille verhütet wird. Die Pille Danach verhindert keine Schwangerschaft bei ungeschütztem Sex nach Einnahme.



STI?

Notfallverhütung bietet keinen Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen (STI). Nur Kondome schützen vor STI.



INFOS!

Weitere Informationen zur Pille Danach sind bei der kostenlosen medizinischen **24 h Hotline 0800 – 5 28 28 28** sowie auf www.pille-danach.de erhältlich.

Hintergrundwissen in Kürze

Ungewollte Schwangerschaft verhindern!

Um eine Schwangerschaft zu verhindern, muss das Zusammentreffen von Spermien und einer befruchtungsfähigen Eizelle verhindert werden. Die Eizelle ist nach dem Eisprung etwa 1 Tag befruchtungsfähig.

Wie funktioniert es?

Spermien sind bis zu 5 Tagen befruchtungsfähig. Die Pille Danach kann den Eisprung um 5 Tage aus dieser Gefahrenzone hinaus verschieben und so eine Schwangerschaft verhindern.

So schnell wie möglich!

Um dem Eisprung zuvorzukommen, muss die Pille Danach so schnell wie möglich nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eingenommen werden! Hat der Eisprung bereits stattgefunden, kann die Pille Danach nicht mehr wirken – es kann zu einer Schwangerschaft kommen.

Der Eisprung ist nicht genau im Voraus berechenbar!

Der Zeitpunkt des Eisprungs ist im Voraus nicht genau berechenbar und kann von Zyklus zu Zyklus und von Frau zu Frau stark variieren. Da kurz vor dem Eisprung das Schwangerschaftsrisiko am höchsten ist, zählt jede Stunde.