

Indicaciones de uso importantes



¡RÁPIDO!

Para conseguir la máxima efectividad, la píldora del día después deberá tomarse lo antes posible tras el fallo anticonceptivo.



¡HASTA 5 DÍAS DESPUÉS!

La píldora del día después con el agente activo acetato de ulipristal puede tomarse hasta 5 días después del fallo anticonceptivo en cualquier momento del ciclo, aunque lo mejor sea tomarla lo antes posible.



¿MENSTRUACIÓN RETRASADA?

La menstruación puede retrasarse un par de días debido a los efectos de la píldora del día después. Un test de embarazo puede aportar calma en este caso.



¿VÓMITOS?

En caso de vomitar en un plazo de 3 horas después de haber tomado la píldora del día después deberá volver a tomar el medicamento.



¿RELACIONES SEXUALES TRAS ellaOne®?

Por motivos de seguridad, deberá utilizar un anticonceptivo de barrera fiable (p. ej., preservativos) hasta la siguiente menstruación, incluso aunque tome la píldora anticonceptiva. La píldora del día después no protege contra un embarazo en caso de tener relaciones sexuales tras tomarla.



¿ETS?

Los anticonceptivos de emergencia no protegen contra las infecciones de transmisión sexual (ETS). Solo los preservativos protegen contra las ETS.



¿INFORMACIÓN?

Encontrará información adicional sobre la píldora del día después llamando al número de atención médica gratuito de **24 h 0800 5 28 28 28**, así como en www.pille-danach.de.

Conocimientos de trasfondo en breve

¡Evitar un embarazo no deseado!

Para evitar un embarazo, hay que evitar que los espermatozoides lleguen a un óvulo fecundable. El óvulo es fecundable durante aproximadamente 1 día después de la ovulación.

¿Cómo funciona?

Los espermatozoides son fértiles durante hasta 5 días. La píldora del día después puede retrasar la ovulación 5 días, evitando este margen de peligro y, por tanto, un embarazo.

¡Lo antes posible!

Para anticiparse a la ovulación, ¡la píldora del día después deberá tomarse lo antes posible tras haber mantenido relaciones sexuales sin protección! Una vez que la ovulación haya tenido lugar, la píldora del día después ya no puede hacer efecto: puede producirse un embarazo.

¡La ovulación no puede calcularse por adelantado de forma exacta!

El momento de la ovulación no puede calcularse por adelantado de forma exacta y puede variar notablemente de ciclo a ciclo menstrual, y de mujer a mujer. Debido a que poco antes de que se produzca la ovulación el riesgo de quedarse embarazada aumenta al máximo, cada hora que pasa cuenta.