

## Önemli kullanım bilgileri



### HIZLI!

Maksimum etki için ertesi gün hapının, korunma sorununun yaşanmasından sonra en kısa sürede alınması gerekir.



### 5 GÜN SONRASINA KADAR!

Ulipristal asetat etki maddeli ertesi gün hapi, korunma sorununun yaşanmasından sonra, mümkün olan en kısa zaman içerisinde 5 günü geçirmemek kaydı ile günün herhangi bir saatinde alınabilir.



### GEÇİKEN ÂDET?

Ertesi gün hapının etkisi nedeniyle adet görme bir kaç gün gecikebilir. Bir gebelik testi rahatlama sağlayabilir.



### KUSMA?

Ertesi gün hapının alınmasından sonra ilk 3 saat içinde kusma durumunda bir hap daha alınmalıdır.



### ellaOne® SONRASI SEKS?

Güvenlik açısından bir sonraki âdet görmeye kadar, doğum kontrol hapi kullanılıyor olsa bile güvenilir bir gebeliği önleyici bariyer (örn. prezervatif) kullanılmalıdır. Ertesi gün hapi, alındıktan sonra korunmasız sekste gebeliği önlemez.



### STI?

Acil korunma, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (STI) karşı koruma sağlamaz. STI'ye karşı korunma sadece prezervatifle mümkündür.



### BİLGİLER!

Ertesi gün hapi hakkında ayrıntılı bilgiler ücretsiz **24 saat tıbbi çağrı merkezi 0800 5282828** ve [www.pille-danach.de](http://www.pille-danach.de) üzerinden edinilebilir.

## Kısaca arka plan bilgisi

### İstenmeyen gebeliklerin engellenmesi!

Bir gebeliği önlemek için spermelerin ve döllenmeye uygun bir yumurtanın birleşmesinin önlenmesi gerekir. Yumurtlama sonrasında yumurta yaklaşık 1 gün döllenmeye uygundur.

### Nasıl işler?

Spermeler 5 güne kadar döllenmeye uygun olarak kalır. Ertesi gün hapi yumurtlamayı bu tehlikeli bölgeden 5 günlüğüne geciktirir ve böylece gebeliği önler.

### Mümkün olduğunca hızlı!

Yumurtlamadan önce davranmak için ertesi gün hapının korunmasız cinsel ilişkiden sonra mümkün olan en kısa sürede alınması gerekir! Yumurtlama gerçekleşmişse ertesi gün hapi artık etki etmez ve bir gebelik oluşabilir.

### Yumurtlama dönemi önceden tam olarak hesaplanamaz!

Yumurtlama zamanı önceden tam olarak hesaplanamaz, dönemden döneme kişiden kişiye önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Gebelik riski yumurtlama döneminden kısa bir süre önce en yüksek noktada olduğundan her saatin önemi vardır.